

В замечательной [статье](#) отечественных авторов (Скидан В.И., Павлюкова Е.Н., Нарциссова Г.П. ИЗОЛИРОВАННАЯ ГИПОПЛАЗИЯ ВЕРХУШКИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, РЕДКАЯ ВРОЖДЕННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ. Сибирский медицинский журнал. 2018;33(1):21-26 <https://doi.org/10.29001/2073-8552-2018-33-1-21-26>), опубликованной в [«Сибирском медицинском журнале»](#)

, представлен обзор научных публикаций посвящённых изолированной гипоплазии верхушки левого желудочка (ИГВЛЖ

). Описывается собственное наблюдение успешного применения хирургической тактики ведения пациента с ИГВЛЖ

в сочетании с некомпактным миокардом и клиническими проявлениями прогрессирования сердечной недостаточности

, которая была впервые применена в России (ФЦССХ, г. Хабаровск). Рассматриваются характерные признаки этой структурной аномалии сердца, описанной совсем недавно.

В 2004 году [Fernandez-Valls M. и соавторы](#), на основании выявленных у трех пациентов сходных специфических изменений сердца при компьютерной и магнитно-резонансной томографии, впервые описали новую структурную аномалию (вероятно, врожденную) – изолированную гипоплазию верхушки левого желудочка. Для неё характерны:

1. сферическая форма левого желудочка со срезанной верхушкой и выбуханием межжелудочковой перегородки вправо в сочетании с нарушением систолической функции левого желудочка;
2. замещение миокарда верхушки левого желудочка жировой тканью;
3. локализация папиллярных мышц на уплощенной верхушке левого желудочка;
4. удлинённый правый желудочек, обтекающий контур верхушки левого желудочка.

С полным текстом статьи можно ознакомиться [здесь](#)